

Arbeitsanweisung Melkstand

1. ruhig arbeiten
2. immer Handschuhe und Ärmelschützer tragen!
3. Handschuhe vor jeder Kuh reinigen und in Peressigsäurelösung desinfizieren
4. korrektes Vormelken in den Vormelkbecher mit Sieb, keine Milch auf den Boden – Erregerstreuung (Anrüstzeit von der ersten Euterberührung bis zur Hauptmelkphase 60-90 Sekunden)
5. Kontrolle der Milch: Flocken, Wasser, Blut, keine Milch
Kontrolle des Euters: Wärme, Rötung, Schwellung, derbes Gewebe, Geruch – bei Verdacht Schalmtest – Schalmtest positiv, dann Behandlungsplan starten),
6. Euterreinigung: mind. 1 Tuch je Kuh, ohne Verwendung von Wasser, beim Ansetzen der Melkzeuge müssen die Zitzen trocken sein.
7. Melkzeug sauber anhängen (wenig Bodenkontakt, wenig Luft)
8. kurz nach der Abnahme, jede Zitze komplett dippen, Jod 3000ppm (Rücklaufsperr). Dabei Kontrolle, ob das Viertel leer und weich ist.
9. Melkzeugzwischeninfektion (Eimer aller 20 Tiere, Becken aller 100 Tiere wechseln)
10. Kontrolle des Melkvakuums, bei Unregelmäßigkeiten verantwortlichen Mitarbeiter benachrichtigen
11. Kontrolle der Pulsatorfunktion, des Lufteinlasses am Sammelstück und der Sauberkeit der milchführenden Teil