

23.17 Checkliste Transitkuh

MVA:

Datum:

1. Aufstallung

Transitgruppen: Schaffung stabiler Transitgruppen - keine Kühe kommen hinzu, bis alle abgekalbt haben	immer	3 Punkte
	manchmal	2 Punkte
	nie	1 Punkt
Platz am Futtertisch	>80cm	3 Punkte
	60-74cm	2 Punkte
	<60cm	1 Punkt
Boxengröße Breite und Länge	>1,3m B, >1,8m L	3 Punkte
	1,2-1,3m B, 1,7-1,8m L	2 Punkte
	<1,2m B, <1,7m L	1 Punkt
Tiefstreufläche	tägl. Reinigung, >9m ²	3 Punkte
	regelm. Reinig., 7-9m ²	2 Punkte
	unzureich. R., <7m ²	1 Punkt
Sprungelenkläsionen an Kühen Haarverlust oder schlimmer	<5%	3 Punkte
	5-10%	2 Punkte
	>10%	1 Punkt
Kopfschwung	>75cm vorn frei, seitlich frei	3 Punkte
	vorn eingeschränkt, seitlich möglich	2 Punkte
	vorn und seitlich eingeschränkt	1 Punkt
Besatzdichte Anzahl Liegeboxen vs. Kühe	>100%	3 Punkte
	90-100%	2 Punkte
	<90%	1 Punkt
Temperaturmanagement Kühlung der Kühe, wenn die Temperatur 20°C übersteigt	Ventilator + Vernebler	3 Punkte
	Ventilator oder Vernebler	2 Punkte
	Weder noch	1 Punkt

2. Kuhfaktoren

Körperkondition BCS zur Kalbung	<10% BCS >3,5	3 Punkte
	10-25% BCS >3,5	2 Punkte
	>25% BCS >3,5	1 Punkt
Zwillingsträchtigkeiten Zwillingstragende Kühe sollten 2 Wochen eher die Transitfütterung bekommen, als alle anderen Kühe	frühe Erkennung und Ketoseprophylaxe;	3 Punkte
	nur Erkennung;	2 Punkte
	keine Erkennung, keine Prophylaxe	1 Punkt
Bewegungsapparat	Keine TS mit LCS >2	3 Punkte
	<10% der TS mit LCS >2	2 Punkte
	>10% der TS mit LCS >2	1 Punkt



pH-Wert im Urin bis 14d ap (mind. 8 Tiere, Durchschnitt)	pH 6,2 – 6,8	3 Punkte
	pH 6,9 – 7,2	2 Punkte
	pH >7,2	1 Punkt
Milchfieber	<5%	3 Punkte
	5-10%	2 Punkte
	>10%	1 Punkt
Nachgeburtsverhaltung	<8%	3 Punkte
	8-10%	2 Punkte
	>10%	1 Punkt
Labmagenverlagerung	<5%	3 Punkte
	5-10%	2 Punkte
	>10%	1 Punkt
Mastitis innerhalb 30d pp	<8%	3 Punkte
	8-10%	2 Punkte
	>10%	1 Punkt

3. Futter und Wasser

Fütterung	ad libitum TMR	3 Punkte
	zugeteilte TMR	2 Punkte
	Einzel-Komponenten	1 Punkt
Futterqualität	sensorisch obB	3 Punkte
	vereinzelt Abweichung	2 Punkte
	generell Abweichung	1 Punkt
Reinigung Futtertisch	täglich	3 Punkte
	alle 2 Tage	2 Punkte
	max. alle 3 Tage	1 Punkt
Pansenfüllung bei Kühen in Transitgruppe	<10% unter Note 5	3 Punkte
	10-20% unter Note 5	2 Punkte
	>20% unter Note 5	1 Punkt
Fütterungsnachschub	>3 mal täglich	3 Punkte
	2-4 mal täglich	2 Punkte
	bis 1 mal täglich	1 Punkt
Fressgitter Es sollte keine neue Erfahrung in der Transitphase sein.	<1 h pro Tag	3 Punkte
	1-2 h pro Tag	2 Punkte
	>2h pro Tag	1 Punkt
Futterreste	>5%	3 Punkte
	<5%	2 Punkte
	Keine Reste	1 Punkt
Rohfaser Anteil ruhender wiederkauender Kühe	>90%	3 Punkte
	70-90%	2 Punkte
	<70%	1 Punkt
Wasserversorgung Trogbreite, Wasserqualität	>10cm/Kuh, sauber	3 Punkte
	5-9cm, trüb	2 Punkte
	<5cm, schmutzig	1 Punkt



Bewertung:

- Alle 3 Punkte: perfekt
- Weniger als 5 mit 2 Punkten, keine 1 Punkte: gut
- Mehr als 5 mit 2 Punkten, keine 1 Punkte: verbesserungswürdig
- Mind. 1x 1 Punkt: Risiko

Kennzahlen:

Abgänge (< 60 Melktagen)	% Kalbungen (%Fä.)	< 7 % (4%)
Geburtshilfen	Kühe (Färsen)	< 15% (30%)
Nachgeburtshaltungen	% Kalbungen	< 10 %
Klin. Mastitis Kühe<60d pp	% Kuhkalbungen	< 25%
Klin. Mastitis Färsen< 60d pp	% Färsenkalbungen	< 15 %
Ketose, Parese pp, Cysten,		
LMV	% DB	< 5 %
Kühe < 30 d pp mit F/E > 1,5	Ketose	< 20 %
Kühe < 100 d pp mit F/E < 1,0	Azidose	< 10 %